



Про епідемічну ситуацію

По ВІЛ/СНІДу в Тернопільській області

за підсумками 10 місяців 2025року.

Протягом 10 місяців 2025 року в області відмічається зменшення кількості вперше виявлених випадків ВІЛ-інфекції /СНІДу з **90** зареєстрованих у 2024 році до **63** - у 2025 році. З них 2 іногородні пацієнти.

Одночасно зменшилася кількість вперше зареєстрованих випадків СНІДу з **33** до **20** (з 366,% у 2024 році до 31,7% у 2025 році)

Як і раніше ВІЛ-інфекцією частіше інфікуються чоловіки . Так ,у **60,6%** випадків хвороба зареєстрована серед чоловіків. відповідно серед жінок -**39,4%**

Основний шлях передачі –статевий -**75,4%**. Продовжують реєструватись випадки з гомосексуальним шляхом передачі.

Парентеральний шлях (в середовищі інекційних споживачив наркотиків)передачі становить 6,5%.

11 дітей народилось від ВІЛ –інфікованих матерів .

Найбільш уразлива вікова група 30-39 та 40-49 років - 50,8 % від зареєстрованих випадків ,проте ,продовжують реєструватись випадки у віковій групі 50 років і старше (21,4 %)

У старшій віковій групі зареєстрований випадок у **74 –літнього чоловіка** ,що потребує уваги до діагностики ВІЛ не залежно від віку і статті ,звертаючи увагу на діагнози при зверненні за медичною допомогою .Пацієнт неодноразово звертався за медичною допомогою з різними клінічними ознаками.

33,3 % випадків зареєстровано серед жителів Тернопільського району .

Випадки ВІЛ-інфекції реєструвалися в 9 ТГ ,а саме ,в Тернопільській ТГ -21 ,в Підволочиській ТГ -3 ,по 2 випадки Скалатській ТГ та Підгаєцькій ТГ Озерянській, по 1 випадку в Збаразькій ,Теребовлянській ,Білецькій ,Золотниківській ТГ .

В Чортківському районі зареєстровані **13** випадків ВІЛ/СНІДу в 12 ТГ , а саме , по 1 випадку у Білобожницькій ,Заліщицькій , Скала Подільській. Бучацькій , Гусятинській ,Хоростківській ,Копиченецькій ,Васильковецькій ,Івано Пустинській,Товстенській,Васильківській ТГ ,2 випадки зареєстровано в Борщівській ТГ.

В Кременецькому районі зареєстровано **14** випадків в 5 ТГ ,а саме , по 1 випадку в Борсуківській , Почаївській ТГ, 3 випадки у Вишнівецькій ТГ , 4 випадки у Ланівецькій ТГ ,5 випадків у Кременецькій ТГ .

Найчастіше у хворих діагностується туберкульоз як СНІД –індикаторне захворювання.

Крім того , у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД як СНІД-індикаторні захворювання реєструються кандидоз , кахексія , синдром виснаження ,пневмоцистна пневмонія ,цитомегаловірусна інфекція токсоплазмоз головного мозку ,лімфома мозку ,інвазивний рак шийки матки та інші захворювання ,які входять у обов'язковий перелік для обстеження з метою раннього виявлення ВІЛ/СНІДу ,що треба враховувати при обстеженні за клінічними показами .